

## PT Programme de Colles

### Semaine 17

#### Intégrales à paramètre

- Fonction définie par une intégrale
- Théorème de continuité : si  $A$  et  $I$  sont deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f$  une fonction définie sur  $A \times I$ , telle que :
  - pour tout  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est continue sur  $A$  ;
  - pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est continue sur  $I$  ;
  - il existe une fonction  $\varphi$  intégrable sur  $I$ , telle que pour tout  $(x, t) \in A \times I$ , on ait  $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$  ;

alors la fonction  $x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est définie et continue sur  $A$ .

- Théorème de dérivation : si  $A$  et  $I$  sont deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f$  une fonction définie sur  $A \times I$ , telle que :
  - pour tout  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $A$  ;
  - pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est intégrable sur  $I$  ;
  - pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$  est continue sur  $A$  ;
  - il existe une fonction  $\varphi$  intégrable sur  $I$ , telle que pour tout  $(x, t) \in A \times I$ , on ait  $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$  ;

alors la fonction  $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $A$  et vérifie :

$$\forall x \in A, \quad g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

- Remarque : le passage éventuel par une domination locale doit faire l'objet d'une question intermédiaire.

#### Isométries d'un espace euclidien

- Isométries d'un espace euclidien, Groupe orthogonal d'un espace euclidien  $E$
- Caractérisations par la conservation du produit scalaire, par l'image d'une base orthonormée.
- Stabilité de l'orthogonal d'un sous-espace stable par une isométrie vectorielle
- Matrices orthogonales. Groupe orthogonal. Caractérisation comme matrice de changement de base orthonormée.
- Caractérisation d'une isométrie vectorielle à l'aide de sa matrice dans une base orthonormée
- Déterminant d'une matrice orthogonale, d'une isométrie vectorielle. Isométrie vectorielle directe, isométrie vectorielle indirecte.
- Isométries vectorielles en dimension 2 :
  - Orientation d'un plan euclidien de dimension 2. Base directe, base indirecte.
  - Description des matrices de  $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ , de  $\text{SO}_2(\mathbb{R})$ .
  - Rotation vectorielle d'un plan euclidien orienté.
  - Classification des isométries vectorielles d'un plan euclidien.
- Isométries vectorielles en dimension 3 :
  - Orientation d'un espace euclidien de dimension 3. Base directe, base indirecte. Orientation d'une droite, d'un plan d'un espace orienté.
  - Rotation et antirotation vectorielles d'axes orientés et d'angles donnés. Symétries orthogonales. Matrices dans une base adaptée.
  - Réduction en base orthonormée d'une isométrie vectorielle d'un espace euclidien de dimension 3. Les étudiants doivent savoir déterminer l'axe et l'angle de la rotation ou de l'antirotation